



« بسمه تعالی »

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان

مرکز آموزشی - درمانی پورسینا

آنوریسم

(آنچه بیماران باید بدانند)



تهیه و تنظیم : زهره قربانی


زیر نظر سوپروایزر آموزشی

تابستان ۹۲

آنوریسم مغزی چیست ؟

یک بیرون زدگی بصورت حباب در جدار شریان های مغزی است . در حقیقت آنوریسم عروق مغزی ناشی از یک ضعف در جدار شریان مغزی است که به تدریج به علت بالا بودن فشار در داخل عروق سبب برجستگی و ایجاد حباب می شود و چون جدار آنها ضعیف تر از جدار طبیعی شریان ها است ممکن است پاره شود و سبب خونریزی مغزی می شود . خونریزی می تواند در فضای ساب آراکنوئید و یا در داخل خود

نسج مغز (اینتراسربرال) ایجاد شود .



علائم بیماری :

علائم به صورت سر درد بسیار شدید و ناگهانی معمولاً بدون سابقه قبلی - تغییر سطح هوشیاری و حتی کما ، اختلالات حرکتی در دست و پا ، استفراغ و تشنج و در صورت نزدیکی عصب چشمی ، کاهش شدید دید ، دو بینی و افتادگی پلک می شود . وزوز گوش ، خواب آلودگی ، و همی پارزی نیز در بعضی موارد دیده می شود .




راههای تشخیصی :

سی تی اسکن ، آنژیوگرافی ، در صورت بالا نبودن فشار داخل مغزی LP .

درمان :

۱. **طبی :** شامل استراحت در تخت همراه با مصرف داروهای آرامبخش برای جلوگیری از بی قراری و استرس .
۲. **جراحی :** در این روش با عمل جراحی ضایعه عروقی را پیدا کرده و با استفاده از کلیپس های مخصوص آنوریسم را می بندند .



اقدامات پرستاری :

بررسی نورولوژیک بیمار شامل :

۱. اختلال سطح هوشیاری

۲. کندی واکنش مردمکها

۳. اختلال عملکرد حسی و حرکتی

۴. افتادگی پلک و صورت

۵. مشکلات تکلم

۶. سر درد و سفتی گردن

نکات :

تمامی بیماران پس از خونریزی داخل مغز باید

در بخش های ویژه بستری گردند .

اختلال سطح هوشیاری که غالباً اولین علامت بد

شدن شرایط در بیمار آنوریسم است بیمار در

تخت استراحت مطلق داشته باشد و در محیط

اتاق آرام و بدون استرس باشد .

زیرا فعالیت بدنی درد و اضطراب سبب افزایش

فشار خون و احتمال خونریزی می شود اجتناب

از کارهایی که موجب افزایش فشار خون مغزی

می شود :

زور زدن ، عطسه شدید ، خم کردن یا چرخاندن

شدید سر و گردن و مصرف دخانیات و هر کاری

که نیاز به فعالیت شدید بدنی داشته باشد .

